

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 5 от 28 июня 2021 года

Исх. № 657 от 28.06.2021

660049, г. Красноярск, Сурикова ул., 54 «В»
Тел/Факс (391) 227-74-96, 227-28-89, e-mail: krstazr@mail.ru
Сайт: rsc024.ru

Капустная моль на посевах рапса



Фото 1. Бабочка капустной моли



Фото 2. Гусеница капустной моли

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю сообщает, что при проведении фитосанитарного мониторинга на посевах ярового рапса отмечено отрождение гусениц капустной моли.

Первые 2-3 дня отродившиеся гусеницы развиваются под эпидермисом листа в «минах», затем ведут открытый образ жизни. Гусеница светло зеленая, веретеновидной формы, при прикосновении падает с листьев и может повиснуть на паутинке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Агрономическим службам хозяйств необходимо обследовать посевы рапса для выявления вредителя. Защитные мероприятия проводить при численности превышающей экономический порог вредоносности (ЭПВ) - 2-3 гусеницы на растение или 10% заселенных растений.

По вопросам фитосанитарных обследований посевов с.-х. культур и получения рекомендаций по их защите обращаться в районные (межрайонные) отделы филиала.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений). При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.

Руководителя филиала



А.В. Малинников