

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 5 от 09 июня 2026 года



660049, г. Красноярск, Сурикова ул., 54 «В»
Тел/Факс (391) 227-74-96, 227-28-89, e-mail: krstazr@mail.ru
Сайт: rsc024.ru

Исх. № от

Лет бабочки и отрождение гусениц капустной моли на посевах рапса



Бабочка капустной моли



Гусеница капустной моли

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю сообщает, что на территории Красноярского края отмечается усиление лёта бабочек капустной моли. На посевах ярового рапса началось отрождение гусениц капустной моли первого поколения в численности 0,1-0,2 гусеницы на одно растение при заселении 6%. Основная масса гусениц 1 возраста, но также встречается и 2 возраст.

Агрономическим службам хозяйств рекомендуется обследовать посевы рапса для выявления вредителя на рапсе раннего срока сева, находящихся в фазе 2-4 настоящих листа. Первые 2-3 дня питание гусеницы проходит в «минах», затем гусеница выбирается наружу и живет открыто. В местах, где проходило питание гусениц ранних возрастов, появляются «окошки» - разрывы. Гусеница светло-зеленая, веретеновидной формы, при прикосновении падает с листьев и может повиснуть на паутинке.

Защитные мероприятия проводить при численности, превышающей экономический порог вредоносности (ЭПВ): 2-3 гусеницы на растение или 10% заселенных растений. Препараты наиболее эффективны от гусениц 1 и 2 возраста.

По вопросам фитосанитарных обследований посевов с.-х. культур и получения рекомендаций по их защите обращаться в районные (межрайонные) отделы филиала.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений). Необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.

Врио руководителя филиала

Н.К. Миллер